




ฉีดวัคซีนหมาแมว

“ป้องกันพิษสุนัขบ้า”



หากโดนสุนัขหรือแมวกัด ให้ล้างแผลด้วยน้ำ และสบู่ หลายๆ ครั้งอย่างน้อย 15 นาที



ห้ามปิดแผล และไปพบ แพทย์ทันทีเพื่อรับการ ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า



ให้เจ้าของนำสุนัขและแมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี

หากพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่า อาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า คือ

มีอาการหวาดตก เดินโซเซ น้ำลายย่อย ลิ้นห้อย ตาขวาง



“ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือผู้นำชุมชน และให้ช่วยกันจับอย่างระมัดระวัง อย่าให้ถูกกัดหรือข่วน ”

1422

สายด่วนกรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
<http://odpc9.ddc.moph.go.th>





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



หยุดเสี่ยงด้วยคาตา 5ย. ป้องกันพิษสุนัขบ้า

1. **อย่าแหย่** ให้สุนัขโมโห



2. **อย่าเหยียบ** สุนัขให้ตกใจ



3. **อย่าแยก** สัตว์ที่กัดกัน ด้วยมือเปล่า



4. **อย่าหยิบ** แย่งจานอาหาร

5. **อย่ายุ่ง** สุนัขที่ไม่ได้เลี้ยง

